

Los expertos prevén 2.500 nuevos casos de cáncer de pulmón en la Comunidad durante 2010

Respaldan el endurecimiento de la ley antitabaco anunciado por el Gobierno

Alicante Los casi 300 oncólogos, cirujanos, radioterapeutas e investigadores que conforman el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) coincidieron ayer en que el cáncer de pulmón seguirá siendo uno de los tumores con más incidencia en España ya que prevén diagnosticar más de 25.000 nuevos casos durante 2010, de los cuales aproximadamente el 10% afectará a pacientes de la Comunidad Valenciana. De ahí que hayan mostrado su apoyo al endurecimiento de la ley antitabaco anunciado por el Gobierno.

Según destacaron ayer, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer que se celebra el próximo jueves 4 de febrero, este tipo de tumores seguirá siendo el más prevalente entre los hombres, con cerca de 22.600 nuevos casos para este año, mientras que en mujeres prevén más de 2.400 nuevos diagnósticos, debido «a la incorporación de la mujer española al hábito tabáquico hace dos décadas», explicó el doctor Bartomeu Massuti, responsable de oncología del Hospital General Universitario de Alicante y secretario del GECP.

De hecho, esta relación entre tabaco y cáncer de pulmón se detecta en el 85% de estos nuevos casos, que resultaron ser personas fumadoras. Asimismo, las perso-

nas que fuman tienen 20 veces más probabilidades de sufrir este tumor mientras que en el caso de los fumadores pasivos, su riesgo de cáncer de pulmón aumenta un 20%.

En cuanto a las tasas de mortalidad, el cáncer de pulmón seguirá siendo durante este año el tumor que produzca más mortalidad,

Los riesgos de fumar

> El 85% de los nuevos casos de cáncer de pulmón están causados por el consumo habitual de tabaco. Los fumadores tienen 20 veces más probabilidades de desarrollar este tumor. En el caso de los fumadores pasivos, el riesgo aumenta un 20%.

> El cáncer de pulmón seguirá siendo el más letal, con una media cercana a las 20.000 defunciones, un 30% por encima de las producidas por cáncer colorrectal, el segundo con mayor mortalidad.

con una media de 19.483 defunciones, un 30% más que las muertes producidas por el cáncer colorrectal, el segundo con mayor mortalidad. De estos fallecimientos, los miembros de este grupo aseguran que el 86% se producirá entre el sexo masculino.

«Si no existiera el tabaco, desaparecerían la mayoría de casos de cáncer de pulmón», explicó Massuti, advirtiendo de que «cuanto antes se empieza a fumar, más riesgo hay de padecerlo».